



Adriatica



agri
coltura
specializzata



Продуктите на AGROFILL® S.r.l.
притежават международен
сертификат UNI EN ISO 9001:2000
за качество

* БАГРАФАРМ ООД

Представител на AGROFILL®, Италия

Каталог на специализирани и универсални торове



ERGON

ЕРГОН

ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР - БИОСТИМУЛАТОР

ХИДРОЛИЗИРАН ЕПИТЕЛ С ЖЕЛЯЗО (Fe) СЪДЪРЖА 19 АМИНОКИСЕЛИНИ И ИЗВЛЕК ОТ ВОДОРАСЛИ

ЕРГОН е изключителна формулация с биокаталитична функция от групата на физиологичните активатори.

Тази органична смес силно стимулира действието на важни ензимни съединения, като по този начин повишава функционалността на всяка една растителна клетка.

Свободните аминокиселини и пептиди са извлечени чрез хидролиза от животински протеини и са прецизно комбинирани с екстракт от морски водорасли (**ASCOPHYLLUM NODOSUM algae**).

Високия процент на желязо предотвратява дефицита на този елемент и стимулира хлорофилната фосфогенеза.

Състав:	
Органичен азот (N)	4%
Водоразтворим органичен азот (N)	3.6%
Органичен въглерод с биологичен произход (C)	12%
Водоразтворимо желязо (Fe)	3%

Аминокиселини:			
Фениланин	0.6%	Пролин	3.4%
Лизин	0.9%	Аспаргинова к-на	1.4%
Триптофан	0.10%	Валин	0.6%
Глутаминова к-на	2.6%	Метионин	0.2%
Тиразин	0.35%	Хидрополин	2%
Аргинин	1.6%	Аланин	2.2%
Изолеуцин	0.4%	Серин	0.45%
Лизин	1.1%	Хистадин	0.3%
Глицин	6.2%	Треонин	0.25%
Цистеин	0.10%		

ЕРГОН влияе положително върху различни механизми във вегетативната фаза:

- подобрява пропускливостта на растителните клетки
- засилва образуването на протеини и въглехидрати с висока хранителна стойност
- стимулира преноса на трасиращи и вторични елементи в растенията
- увеличава устойчивостта на културите към болести и неприятели
- повишава значително качеството и количеството на продукцията

ЕРГОН е особено подходящ за онези култури, които показват застой и нарушение в развитието си поради неблагоприятни климатични условия (градушки, ранни или късни слани, термохидрометрични промени, асфикция на корена, нараняване и др.).

ЕРГОН може да бъде успешно прилаган при всички култури, когато искате да дадете тласък на културите за по висок и качествен добив.

ЕРГОН е одобрен от производителя ADRIATICA SPA в Италия за ползване в биологичното земеделие.

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА - ПОЧВЕНО И ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ

Култури	Фази на приложение	Доза
Зеленчуци и цветя	3-4 третирания	150-200 г/100 л вода (150-200 г/дка)
Житни култури, слънчоглед	1-2 третирания	100-150 г/дка
Лозя	2-3 третирания	100-150 г/100 л вода (100-150 г/дка)
Овощни	3-4 третирания	150-200 г/100 л вода (100-150 г/дка)
Фуражни култури	3-4 третирания	150-200 г/дка
Оранжеви култури	2-4 третирания	100 г/100 л вода да се прилага в студените часове на деня
Дървета и храсти	2-3 третирания	150-200 г/100 л вода (100-150 г/дка)
Ягоди	3 третирания	100-150 г/100 л вода (100-150 г/дка)



NUTRI BIO

НУТРИ БИО

ОРГАНИЧЕН АЗОТЕН ТОР - АКТИВАТОР

РАЗТВОР ОТ ХИДРОЛИЗИРАН ЕПИТЕЛ. СЪС 50% СЪДЪРЖАНИЕ НА 19 АМИНОКИСЕЛИНИ


НУТРИ БИО е течна формулация, която осигурява лесно усвоими органични хранителни вещества, така необходими за растенията. Високото съдържание на свързани аминокиселини (**50%**) в комбинация с азот (**8%**) прави продукта особено подходящ за задоволяване хранителните потребности на всички култури през началните фази от развитието им, когато необходимостта от прецизно и балансирано торене е голяма.

Съдържанието на органичен въглерод (**25%**) съвместно с хлорофила осигуряват бърз и качествен синтез на органичните съединения.

Аминокиселините в този комплекс индуцират по-голяма метаболитна активност, която се отразява благоприятно в следващите фази от развитието на растенията. Това допринася за по-добър и дружен цъфтеж, плодообразуване, нарастване и качество на плода, което гарантира повишаване на добивите.

Приложението на **НУТРИ БИО** е особено подходящо за предпазване и бързо възстановяване на растенията в следствие на стресови ситуации причинени от неблагоприятни климатични условия, вредители и болести.

НУТРИ БИО подобрява биологичните характеристики на почвата чрез стимулиране развитието на полезни микроорганизми.



ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Листно:

150-200 г/дка през
активна вегетация

Почвено: 2-3 кг/дка

Нутри Био може да се
прилага през 10-15 дни.



Състав:

Органичен азот (N) 8%

Водоразтворим органичен азот (N) 8%

Органичен въглерод
с биологичен произход (C) 25%

Аминокиселини:

Аланин	4.5%	Изолефцин	0.8%
Аргинин	3.2%	Лицин	1.8%
Аспаргинова к-на	2.8%	Лизин	2.2%
Цистеин	0.2%	Метионин	0.4%
Глутаминова к-на	5.2%	Пролин	6.9%
Фениланин	1.2%	Серин	0.9%
Глицин	12.6%	Тирозин	0.7%
Хидропролин	4.1%	Треонин	0.5%
Хистидин	0.6%	Триптофан	0.2%
		Валин	1.3%



MICROPHOS Mo, Zn

МИКРОФОС Mo Zn

ЕО ТОР

Микрогранулиран азотно-фосфорен тор
с молибден (Mo) и цинк (Zn)

**МИКРОФОС Mo Zn е иновационен продукт
на световния и българския пазар.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИКРОФОС Mo Zn е двукомпонентен бързо усвоим, микрогранулиран азотно - фосфорен тор + молибден и цинк с големина на гранулата 0.5-2 мм (колкото рапично семе).

Прилага се почвено при **пшеница, ечемик, рапица, както и при царевица, сорго, ориз, слънчоглед, соя, картофи, овощни, горски и декоративни, зеленчукови, тютюн и др.**

Особено ефективен при локализирано торене, внесен със сеитбата.

При пшеница, ечемик, рапица може да се постави директно във сеялката и се смесва със семената по време на сеитба.

- спестява есенното торене с допълнителна техника
- осигурява безпроблемно презимуване със силна коренова система и добре развити растения
- бързо усвоимото съдържание на азот, фосфор и микроелементите Mo и Zn в точен баланс имат забележително "стартиращо" действие - стимулират ризогенезиса, развитието в началните фази и изключително бързото възобновяване на вегетацията през пролетта - изпреварващо - с 10-15 дни, особено в "студени" есенно - пролетни почви
- изтегля вегетацията напред, което предпазва от пролетни засушавания
- попада в реда, непосредствено до семената - това води до прилагане на по-ниски дози и се избягва подхранването на плевелната растителност в междуредовите разстояния
- при добра агротехника и качествен посевен материал, приложението на **МИКРОФОС Mo Zn** води до значително увеличаване на добива и качеството на получената продукция.

Състав:

Общ азот (N)	10%
амонячен (N)	10%
Водоразтворим фосфор (P_2O_5)	46%
Водоразтворим молибден (Mo)	0.002%
Водоразтворим цинк (Zn)	1.8%

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Доза на приложение:

почвено - 2.5-3.5 кг/дка

Смесва се директно в сеялката със семената за посев (пшеница), или се поставя в прикачени устройства за торене към сеялката - апликатори.

Малкият размер кръгла гранула позволява отлична смесимост и разпределение с посевния материал при попадане в почвата по време на сеитба.

- На малки площи може да се разхвърля равномерно.
- За трайни насаждения: **10-30 г** на растение.
- За разсадопроизводство: **0.500-0.700 кг** смесени в 1 м³ почва.



MICROPHOS-K

МИКРОФОС-К

НРК МИКРОГРАНУЛИРАН ЕО TOP 8-33-10 (MgO+SO₃)

Микрофос-К е микрогранулиран NPK тор, предназначен за използване по време на сеитба или разсаждане при всички култури в ранни фази от развитието им.

Особено подходящ за почви със слаби адсорбционни качества и приложение след отмиване на хранителните вещества вследствие преовлажняване и пролетно снеготопене.

Тази формулация работи на ниво ризосфера (коренова система) възможно най-близо до семената и младите корени, като дава възможност за по-ниски дози и цялостно усвояване на хранителните вещества.

Състав:

Общ азот (N)	8%
амонячен	8%
Общ фосфор (P₂O₅)	33%
фосфорен пентоксид разтворим в	
неутрален амониев цитрат и вода	33%
водоразтворим фосфорен пентоксид	29%
Калиев окис (K₂O)	
водоразтворим свободен от хлориди	10%
Магнезиев окис (MgO)	2%
Сяра (SO₃)	
водоразтворима	9%
Молибден (Mo)	0.002%
Цинк (Zn)	0.8%



Доза на приложение: 2.5-4 кг/дка

Гранула с големина: 0.8-1.2 мм

МИКРОФОС - К дава възможност за успешно начално развитие на растенията, благодарение на прецизно балансираната и лесно усвоима формулация.

- Съдържанието на **КАЛИЙ** в микрогранулата дава отличен ефект и компенсира острата необходимост от него, вследствие отмиване в леки пясъчливи почви и при тежки глинести почви, където е трудно усвоим. Калият се усвоява активно в началните фази от развитие на растенията, участвайки в образуването на въглехидрати и белтъчини, както и катализиране на азотния обмен. Той е важен елемент за усвояване и придвижване на водата, натрупвайки се в младите върхни части на растенията.
- ФОСФОРЪТ** участва активно във важни биологични процеси, стимулира и ускорява развитието на кореновата система в дълбочина, давайки начален тласък в развитието на растенията.
- Количеството **АЗОТ** във формулацията спомага за бързото първоначално развитие на кореновата система и натрупване на биомаса в младите тъкани.
- МАГНЕЗИЯТ** влиза в молекулата на хлорофила и в състава на органичните вещества, натрупвайки се в най-жизнетата част от семето – зародиша. Играе важна роля в придвижването на фосфора и дишането.
- СЯРАТА** влиза в състава на белтъчините, витамините и глюкозидите, активира дейността на ензимите.
- Наличието на **ЦИНК** в микрогранулата предпазва младите надземни части от токсично външно влияние, участва пряко в дишането, фотосинтезата и химичния обмен.
- МОЛИБДЕНЪТ** има важно значение, участвайки в редукцията на постъпилите в кореновата система нитрати до амоняк, в синтеза на белтъчините и свързването на атмосферния азот.

POLIFILL MAGNISOL

ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ

ЕО TOP

АЗОТЕН TOP N 20 + MgO 5 + SO₃ 10

С МОЛИБДЕН (Mo) И ЦИНК (Zn)

ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ N 20 Mo Zn е течена формулация за листно приложение, характеризираща се със силно стимулиращо действие за оптимален растеж и развитие на културите. Това се дължи на специфичната връзка между **АЗОТ**, **МАГНЕЗИЙ** и **СЯРА**. Комбинацията благоприятства процеса на фотосинтеза и баланс на хранителни вещества необходими на растенията във всички вегетативни фази и особено в началното развитие.

Азотната фракция е бързо усвоима и нетоксична дори и при високи дози.

В последните фази на развитие на растението действието на **МАГНЕЗИЙ** е от съществено значение за поддържане на функционалността на листата, като по този начин стимулира обмяната на хранителни вещества продължително и съответно повишава продуктивността на културите.

СЯРАТА, представена в правилното съотношение с **МАГНЕЗИЙ** и **АЗОТ**, активира синтеза на аминокиселини и формирането на важни за развитието протеинови съединения.

Употребата на **ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ N 20 Mo Zn** предотвратява все по-често срещаните физиологично-патологични състояния на културите, свързани с недостига на **МАГНЕЗИЙ** и **СЯРА**. Киселинната реакция на **ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ N 20 Mo Zn**, свързана с действието на чисти органични киселини, стимулира процеса на абсорбация на листата и способства за добра смесимост с други торове и пестициди. Микроелементите МОЛИБДЕН (Mo) и ЦИНК (Zn) с действието си гарантират балансирано и хармонично развитие на растението.

ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ N 20 Mo Zn се препоръчва за употреба при: полски култури (пшеница, царевица, рапица, слънчоглед; промишлени култури (картофи, домати, спанак, лук, моркови); при плодове и зеленчуци в ранните фази на развитие; декоративни видове, а също и в комбинация с фосфорни и калиеви формулации.

Употребата на **ПОЛИФИЛ МАГНИСОЛ N 20 Mo Zn** е особено ефективна в лозарството в начало на зреене при сортове грозде, чувствителни към небалансирано съотношение между Магnezий и Сяра.

Състав:

Общ азот (N)	20%
Уреен азот (N)	20%
Водоразтворим магнезиев оксид (MgO)	5%
Водоразтворим серен триоксид (SO ₃)	10%
Водоразтворим молибден (Mo)	0.002%
Водоразтворим цинк (Zn)	0.1%

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Може да се прилага през 8-15 дни в зависимост от културата

Листно: 350-800 г/дка

Почвено: 1.5-2.0 кг/хл



AGROZIN 9 L COMPLEX

АГРОЦИНК 9Л КОМПЛЕКС

ТЕЧЕН ЕО TOP С 9% УСВОИМ ЦИНК (Zn)

В АГРОЦИНК 9Л КОМПЛЕКС съдържанието на **ЦИНК (Zn)** е свързано със специално органично съединение, което подобрява адсорбцията и асимилацията му от растенията.

ЦИНКЪТ (Zn) оказва пряко или косвено влияние върху фотосинтезата, дишането, биосинтеза на хлорофил и растежните регулатори, фосфорния, азотния и въглехидратен обмен.

Прилага се при поява на цинков дефицит или превантивно при рапица, царевица, лозя и др., като предотвратява физиологичните нарушения, предизвикани от спиране на нарастването на вегетативния връх, дребнолистие, хлороза, скъсяване на междувъзлията, покафеняване на листата и ивици по тях.

ЦИНКЪТ (Zn) е особено необходим в началните фази от развитието на културите.

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Листно: 100-250 г/дка

Препоръчва се при зърнени, полски, зеленчукови и овощни култури, лозя, тютюн.

В оранжерии да се третира в хладните часове на деня.



SPECIALE CEREALI

ЖИТНИ СПЕЦИАЛ

ЕО TOP ТЕЧЕН КОМБИНИРАН TOP NPK 16 6 9 С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

ЖИТНИ СПЕЦИАЛ е течен листен тор, специално формулиран за задоволяване хранителните нужди на всички житни култури: **пшеница, ечемик, ръж, овес**, както и **царевица, ориз, сорго** и др. Благодарение на оптимално балансираното съдържание на макроелементите **NPK** и тяхното съотношение (2.6:1:1.5) този тор притежава забележителна **“анти стрес”** и **“растежна”** функция.

Трасиращите елементи (комплексите **B** и **Mo**, хелатните **Cu, Mn, Zn**), доосигуряват балансираното развитие на житните растения и ги предпазват от типичните проблеми, причинени от дефицита им:

- смущения при цъфтеж;
- обезцветяване;
- нацепване на листата;
- стресово спиране на растежа;
- атрофия на вегетативния връх.

Състав:

Общ азот (N)	16%
амонячен	1.4%
уреен	14.6%
Двуфосфорен петоокис (P_2O_5), водоразтворим	6%
Калиев окис (K_2O), водоразтворим	9%
Бор (B), водоразтворим	0.05%
Мед (Cu), водоразтворим	0.02%
Мед (Cu), хелатен по EDTA	0.02%
Молибден (Mo), водоразтворим	0.01%
Цинк (Zn), водоразтворим	0.1%
Цинк (Zn), хелатен по EDTA	0.1%



ЖИТНИ СПЕЦИАЛ стимулира растежа и също така елиминира дисбаланса, предизвикан при неблагоприятни климатични условия или нападения от болести и неприятели, подобрява фотосинтезата и синтеза на органични съединения, влияе положително на цъфтежа, и така осигурява висок и качествен добив.

ЖИТНИ СПЕЦИАЛ подпомага миграцията на въглехидрати в самото клетъчно ядро и повишава съдържанието на глутен в зърното. Подобрява хлебопекарните качества.

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Листно подхранване:

- 300-450 г/дка от ранни фази на растеж - трети лист на културата до цъфтеж.
- Съвместим с използваните в практиката пестициди.
- Добавя се последен в разтвора.
- Не се влияе от температурата по време на третиране.
- Не запушва дюзите.
- Не вкислява почвата.
- Свободен от хлор и натрий.

BULL K БУЛ - К

ТЕЧЕНЕО TOP NK 3-30

БУЛ - К е тор с високо съдържание на усвоим калий - 30%.

Може да се прилага листно и капково през цялата активна вегетация на растенията.

Благодарение на течната формулация, се постига бързо и прецизно приготвяне на работния разтвор.

Състав:

Общ азот (N)	3%
уреен азот	3%
Калиев окис (K_2O)	30%

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Листно: 300-500 г/дка

Почвено: 3-5 кг/дка (1-2 г/л)



БУЛ - К се препоръчва особено за калиеволюбиви култури, както и за третиране във фазите от развитие на растенията през които те се нуждаят от повече калий. Стимулира плододаването и качеството на продукцията.

Калия има важно значение за хранителния и воден режим на растенията. Концентрира се основно в органите с интензивна обмяна на веществата, повишава съдържанието на захари и скорбяла. Задоволените с калий растения имат по-добра сухо и студоустойчивост, оптимална биологична активност при по-високи температури, по-добър тургор на клетките обуславящ активен растеж.

БУЛ - К е подходящ за полски култури - житни, слънчоглед, царевица, зеленчуци, цъфтящи растения, технически култури, (картофи, цвекло, памук, тютюн), овощни (костилкови, семкови) лозя, фуражни култури, декоративни растения, цветя и др.

БУЛ - К е 100% разтворим във вода и усвоим от растенията. Смесим е с пестициди, не запушва дюзите по време на третиране, не киселява почвата.



IDRON 12 6 36+2.5MgO

ИДРОН 12 6 36+2.5MgO

ЕО TOP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодарение на високото съдържание на калий **ИДРОН 12 6 36** е подходящ за калиеволюбивы култури и се препоръчва за приложение във фазите от развитие на всички растения, когато е необходим повече калий, при всички културни и декоративни видове. Стимулира плододаването и качеството на плода. Приложенията могат да започнат от началото на развитие до края на вегетацията на растенията. Правете няколко третиране с **ИДРОН 12 6 36**, в доза 3-6 кг/1000 м² при почвено приложение. При листно третиране 300-600 г/дка (не надвишавайте концентрацията от 0.3% - 300 г на хектолитър)

Състав:

Общ азот (N)	12%
нитратен (N)	10%
амонячен (N)	2%
Фосфорен петокис (P ₂ O ₅)	6%
разтворим в амониев цитрат и вода	
Водоразтворим фосфор (P ₂ O ₅)	6%
Водоразтворим калий (K ₂ O)	36%
Водоразтворим магнезий (MgO)	2.5%
Водоразтворим бор (B)	0.01%
Мед (Cu) хелатен по EDTA	0.002%
Водоразтворимо желязо (Fe)	0.02%
Желязо (Fe) хелатно по EDTA	0.02%
Водоразтворим манган (Mn)	0.01%
Манган (Mn) хелатен по EDTA	0.01%
Водоразтворим молибден (Mo)	0.001%
Водоразтворим цинк (Zn)	0.002%
Цинк (Zn) хелатен по EDTA	0.002%

IDRON 20 20 20

ИДРОН 20 20 20

ЕО TOP

100% разтворим комбиниран тор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодарение на балансираното съдържание на азот/фосфор/калий в съотношение 1:1:1, **ИДРОН 20 20 20** е подходящ да задоволи хранителните нужди на растенията във всеки етап на растежа. Съдържа основните макро и микроелементи, осигуряващи високи добиви и качество на продукцията при всички културни и декоративни растения. Кристалната форма позволява пълното му усвояване от растенията и постигане на оптимален растеж, предсказуем цъфтеж, устойчивост на болести, равномерни и очаквано високи добиви. Третиранията могат да започнат от ранни фази на растеж до края на вегетацията. При интензивни култури може да се прилага през 10 - 14 дни.

Състав:

Общ азот (N)	20%
нитратен (N)	5.6%
амонячен (N)	3.9%
уреен (N)	10.5%
Водоразтворим фосфор (P ₂ O ₅)	20%
Водоразтворим калий (K ₂ O)	20%
Бор (B)	0.01%
Мед (Cu)	0.002%
Желязо (Fe)	0.02%
Манган (Mn)	0.01%
Молибден (Mo)	0.001%
Цинк (Zn)	0.003%

Микроелементите са в хелатна форма по EDTA



ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Почвено торене:

3-6 кг/дка (0.5-2 г/л)

Листно подхранване:

250-350 г/100 л вода

250-350 г/дка

Свободен от хлор и натрий.

Съвместим с използваните в практиката пестициди.

Не запушва дюзите по време на третиране.

Не вкислява почвата.

IDRON 9 50 9

ИДРОН 9 50 9

ЕО TOP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИДРОН 9 50 9 е подходящ за фосфоролубивы растения. Прилага се и във фазите от развитие на всички култури, през които те се нуждаят от повече фосфор. Задоволява хранителните нужди на всички растения отглеждани в оранжерии, **през началните фази от развитието им** (разсаждане, височина 15-20 см). Допринася за по-доброто вкореняване, стимулира развитието на кореновата система и цялостния начален растеж. Може да се прилага през 10-14 дни.

Състав:

Общ азот (N)	9%
амонячен (N)	9%
Водоразтворим фосфор (P ₂ O ₅)	50%
Водоразтворим калий (K ₂ O)	9%
Водоразтворим бор (B)	0.01%
Водоразтворима мед (Cu)	0.002%
мед (Cu) chelated by EDTA	0.002%
Водоразтворимо желязо (Fe)	0.02%
желязо (Fe) chelated by EDTA	0.02%
Водоразтворим манган (Mn)	0.01%
манган (Mn) chelated by EDTA	0.01%
Водоразтворим молибден (Mo)	0.001%
Водоразтворим цинк (Zn)	0.003%
цинк (Zn) chelated by EDTA	0.003%

VIGNAFILL 2

ВИНИФИЛ 2

ЕО TOP

Азотно-калиев листен тор за лозя
с магнезий (Mg) и бор (B)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИНИФИЛ 2 е специална течна формулация, създадена за листно подхранване и почвено торене на лозя. Прилага се от фази - **цъфтеж, наливане на плода до пълното узряване**. В тези етапи от развитие лозята се нуждаят от достатъчни количества калий. Точният процент азот способства за абсорбиране и пренос в растението на калий.

Едновременното присъствие на **бор и магнезий** предпазват от болести, причинени при недостига им; също така способства за **абсорбцията на калий** и така подпомагат **образуването на протеини и натрупването на захари**. Борът подобрява **ензимните процеси**, като в същото време **регутира водния баланс**.

Приложението на **ВИНИФИЛ 2** е особено ефективно във втората половина от развитието на растенията - след цъфтеж до пълно узряване.

Повишава **устойчивостта на растенията към** гъбни болести, засушаване и подобрява **органолептичните свойства на гроздето**. Увеличава значително **добива и качеството** на получената продукция както при винените, така и при десертните сортове грозде.

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Листно подхранване:

Винифил 2 се прилага за листно подхранване в доза **350-500 г/дка в 100 л вода**. Съвместим с пестициди, добавя се последен в разтвора!


Почвено торене:

Прилагайте **Винифил 2** с всяка напоителна система (оросяване, поливане, капково напояване, подпочвено напояване и т.н.) от фаза след цъфтеж до оцветяване на плода. Доза: **4-5 кг/дка на всеки 15-18 дни**.



Състав:

Общ азот (N)	5%
нитратен (N)	1.1%
уреен (N)	3.9%
Водоразтворим калий (K₂O)	10%
Водоразтворим магнезий (MgO)	3%
Водоразтворим бор (B)	0.05%





Agrofill® quality system in certified by ISO 9001 : 2008 - Certificate n. 44 100 097462



Представител за България

✿ **БАГРАФАРМ ООД**

София 1510

ул. Макгахан, бл. 55А

тел./факс 02 840 35 09

0888 635 120

0886 565 059

0885 648 835

e-mail: bagrafarm@abv.bg

www.bagrafarm.com